



CORONA-IMPfstoffe im Überblick

	Haltbarkeit aufgetaut (ungeöffnet!)	Haltbarkeit nach anbrechen / aufziehen	Dosen pro Durchstechflasche	Benötigte Impfdosen	Empfohlener Abstand	Zulassung	Abrechnung*		
							Erstimpfung	Zweitimpfung	Auffrischimpfung
Biontech/Pfizer (Comirnaty®) Original	Konzentrat: 31 Tage bei 2-8°C, 2 h bei RT bis 30°C; Fertiglösung und (Klein-)kinderimpfstoffe: siehe Variantenimpfstoffe	6 Stunden bei 2-30°C	6 x 0,3ml (7 x 0,3ml als ungesicherter Erfahrungswert) (Klein-)kinderdosierung: 10 x 0,2ml	2, bei (Klein-)kindern STIKO-Empfehlungen beachten!	3-6 Wochen	ab 12 Jahre, in Kinderdosierung ab 5-11 Jahre, Kleinkinddosierung ab 6 Monaten - 4 Jahre	88331A	88331B	88331R
Orig./BA.4-5 und Orig./BA.1**	10 Wochen bei 2-8°C, 12 Stunden bei RT bis 30°C	12 Stunden bei 2-30°C	6 x 0,3ml			ab 12 Jahre, bisher nur als Booster!	88337A	88337B	88337R
Moderna (Spikevax®) Original	30 Tage bei 2-8°, 24 Stunden bei 8-25°C	19 Stunden bei 2-25°C	10 x 0,5ml	2, bei (Klein-)kindern STIKO-Empfehlungen beachten! STIKO: erst ab 30 Jahren	4-6 Wochen	ab 12 Jahren; in Kinderdosierung ab 6-11 Jahre, Kleinkinddosierung ab 6 Monate-5 Jahre.	88332A	88332B	88332R
Orig./BA.4-5 und Orig./BA.1**	siehe Original-Impfstoff	siehe Original-Impfstoff	5 x 0,5ml			ab 12 Jahre, nur Booster!	88338A	88338B	88338R
Astrazeneca (Vaxzevria®) Seit 1. Dezember 2021 nicht mehr verfügbar	6 Monate bei 2-8°C	48 Stunden bei 2-8°C, in der Injektionsspritze 6 Stunden bis zu 30°C	8 oder 10 x 0,5ml (bis zu 12 x 0,5ml als Erfahrungswert)	2	9-12 Wochen; bei <60 Zweitimpfung i.d.R. mit mRNA-Vakzine	ab 18 Jahre, laut STIKO jedoch regelhaft nur ab 60 Jahren einzusetzen!	88333A	88333B	
Johnson & Johnson (Janssen Ad26.COVS.2.S)	3 Monate bei 2-8°C, 12 Stunden bei 9-25°C	6 Stunden bei 2-8°C, 3 Stunden bei Raumtemperatur (maximal 25°C)	5 x 0,5ml (7 x 0,3ml als ungesicherter Erfahrungswert)	1 (+1 mRNA)	2. Impfung mit mRNA-Vakzine nach 4 Wochen z. vollständigen Immunisierung	ab 18 Jahre, laut STIKO-Empfehlung jedoch regelhaft nur ab 60 Jahren einzusetzen!	88334A	88334B	88334R
Novavax (Nuvaxovid)	9 Monate im Dunkeln bei 2-8°C	6 Stunden bei 2-25°C	10 x 0,5ml	2	3 Wochen	ab 12 Jahre	88335A	88335B	88335R
Valneva (VLA2001)	15 Monate bei 2-8°C	6 Stunden bei bis zu 25°C	10 x 0,5ml	2	28 Tage	18 bis 50 Jahre	88336A	88336B	

*Regionale KVen können von den Abrechnungsziffern abweichen; eigene Ziffern für berufliche Impfung sowie in Heimen. **Omikron-Varianten bisher nur zur Auffrischung zugelassen